vollständige Gebietsdaten, Berichtspflicht 2012, auf Bundeslandebene (Sachsen-Anhalt)

Filterbedingungen:

- Gebietsnummer in 5038-301

- Berichtspflicht 2012

Gebiet

Gebietsnummer:	5038-301	**Gebietstyp:**	C
Landesinterne Nr.:	F156/S31	**Biogeographische Region:**	K
Bundesland:	Sachsen-Anhalt		
Name:	Zeitzer Forst		
geographische Länge (Dezimalgrad):	12,0389	**geographische Breite (Dezimalgrad):**	50,9881
Fläche:	1.718,00 ha		
Vorgeschlagen als GGB:	Oktober 2000	**Als GGB bestätigt:**	Dezember 2004
Ausweisung als BEG:		**Meldung als BSG:**	Oktober 2000
Datum der nationalen Unterschutzstellung als Vogelschutzgebiet:			
Einzelstaatliche Rechtgrundlage für die Ausweisung als BSG:			
Einzelstaatliche Rechtgrundlage für die Ausweisung als BEG:			
Weitere Erläuterungen zur Ausweisung des Gebiets:			
Bearbeiter:			
Erfassungsdatum:	Februar 2000	**Aktualisierung:**	Mai 2016
meldende Institution:	Sachsen-Anhalt: Landesamt (Halle (Saale))		

TK 25 (Messtischblätter):

MTB	4937	Osterfeld
MTB	4938	Zeitz
MTB	5037	Eisenberg
MTB	5038	Gera Nord
Inspire ID:		
Karte als pdf vorhanden?		nein

NUTS-Einheit 2. Ebene:

DEE0	Sachsen-Anhalt

Naturräume:

466	Altenburg-Zeitzer Lößgebiet
471	Saale-Elster-Sandsteinplatte
naturräumliche Haupteinheit:	
D18	Thüringer Becken mit Randplatten

Bewertung, Schutz:

Kurzcharakteristik:	Ehemaliger Truppenübungsplatz mit ausgedehnten, sich wieder bewaldenden Offenflächen, meist Landreitgras-Fluren. Im Randbereich Bachtälchen innerhalb naturnaher Laubwaldbestände.
Teilgebiete/Land:	
Begründung:	Infolge vielfält.Standorteigensch.Ausbild.unterschiedl.Waldgesellsch.v.natural bis uniform.Diese Vielfalt ermöglicht hohe Tierartendiversität.Brut-u.Nahrungsgeb.z.T.Jahreslebensraum typ.Vogelart.d.Gebüsche,Wälder sowie des Offenlandes.
Kulturhistorische Bedeutung:	Im Gebiet haben sich zahlreiche vorgeschichtliche Grabhügel erhalten. Zudem sind mehrere jungsteinzeitliche Siedlungen bekannt.
geowissensch.	Sand- und Schluffsteine des Unteren/Mittleren Buntsandsteins im Bereich der Zeitz-Schmöllner-Mulde.

Bedeutung:	
Bemerkung:	

Biotopkomplexe (Habitatklassen):

E	Fels- und Rohbodenkomplexe	1 %
F1	Ackerkomplex	3 %
G	Grünlandkomplexe trockener Standorte	26 %
H	Grünlandkomplexe mittlerer Standorte	7 %
I2	Feuchtgrünlandkomplex auf mineralischen Böden	1 %
K	Zwergstrauchheidenkomplexe	3 %
L	Laubwaldkomplexe (bis 30 % Nadelbaumanteil)	42 %
L7	Bergmischwaldkomplex	1 %
N	Nadelwaldkomplexe (bis max. 30% Laubholzanteil)	5 %
O	anthropogen stark überformte Biotopkomplexe	3 %
R	Mischwaldkomplex (30-70% Nadelholzanteil, ohne natürl. Bergmischwälder)	8 %

Schutzstatus und Beziehung zu anderen Schutzgebieten und CORINE:

Gebietsnummer	Nummer	FLandesint.-Nr.	Typ	Status	Art	Name	Fläche-Ha	Fläche-%
5038-301		0043BLK	LSG	b	*	Aga-Elster-Tal und Zeitzer Forst	5.124,00	100

Legende

Status	Art
b: bestehend	*: teilweise Überschneidung
e: einstweilig sichergestellt	+: eingeschlossen (Das gemeldete Natura 2000-Gebiet umschließt das Schutzgebiet)
g: geplant	-: umfassend (das Schutzgebiet ist größer als das gemeldete Natura 2000-Gebiet)
s: Schattenlisten, z.B. Verbandslisten	/: angrenzend
	=: deckungsgleich

Bemerkungen zur Ausweisung des Gebiets:

Gefährdung (nicht für SDB relevant):

Eine Gefährdung der Offenlandbereiche geht von der zunehmenden Verbuschung und Wiederbewaldung aus. Teilbereiche sind durch Sukzessionsvorgänge (Bewaldung) gefährdet.

Einflüsse und Nutzungen / Negative Auswirkungen:

Code	Bezeichnung	Rang	Verschmutzung	Ort
A07	Einsatz von Bioziden, Hormonen und Chemikalien (Landwirtschaft)	gering (geringer Einfluß)		innerhalb
A08	Düngung	gering (geringer Einfluß)		innerhalb
B02.01	Wiederaufforstung (auf Waldbodenfläche, z.B. nach Einschlag)	hoch (starker Einfluß)		innerhalb
B02.03	Vernichtung der Kraut- oder Strauchschicht (Forstwirtschaft)	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		ausserhalb
D01.01	Fuß- und Radwege (inkl. ungeteerter Waldwege)	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		ausserhalb

Einflüsse und Nutzungen / Positive Auswirkungen:

Code	Bezeichnung	Rang	Verschmutzung	Ort
A03	Mahd	gering (geringer Einfluß)		innerhalb
A04	Beweidung	gering (geringer Einfluß)		innerhalb

F03.01	Jagd	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb

Management:

Institute

LSA: LK Burgenlandkreis
Burgenlandkreis Amt für Natur- und Gewässerschutz

Status: V: Bewirtschaftungsplan in Vorbereitung

Pflegepläne

Maßnahme / Plan	Link

Erhaltungsmassnahmen:

Erhalt. u. Wiederherst. eines günst. Erhaltungszust. der gemeldeten Lebensr. (einschl. aller dafür charakterist. Arten) u. Arten n. FFH-RL u. VSRL

Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie

Code	Name	Fläche (ha)	PF	NP	Daten-Qual.	Rep.	rel.-Grö. N	rel.-Grö. L	rel.-Grö. D	Erh.-Zust.	Ges.-W. N	Ges.-W. L	Ges.-W. D	Jahr
3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions	0,0870			G	C			1	C			C	2012
3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions	1,5140			G	C			1	B			B	2012
4030	Trockene europäische Heiden	6,9120			G	C	4	1	1	C	C	C	C	2012
4030	Trockene europäische Heiden	37,6860			G	C	4	1	1	B	C	C	C	2012
6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae)	5,2620			G	C			1	B			C	2012
6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe	0,0660			G	B	3	1	1	A	B	B	C	2012
6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe	0,1010			G	B	3	1	1	B	B	B	C	
6510	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)	46,7680			G	C			1	B			C	2012
6510	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)	1,6720			G	C			1	A			C	2012
6510	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)	14,2330			G	C			1	C			C	2012
7220	Kalktuffquellen (Cratoneurion)	0,0100			G	C			1	B			C	2012
9110	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	1,7180			G	B	2	2	1	B	B	B	C	2012
9130	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	21,1010			G	C			1	C			C	2012
9130	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	74,0010			G	C			1	B			C	2012
9160	Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Hainbuchenwald (Carpinion betuli) [Stellario-Carpinetum]	15,9800			G	C			1	C			C	2012
9160	Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder	3,5400			G	C			1	B			C	2012

	Hainbuchenwald (Carpinion betuli) [Stellario-Carpinetum]													
9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald Galio-Carpinetum	121,5950			G	B	3	2	1	C	B	B	B	2012
9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald Galio-Carpinetum	8,6100			G	B	3	2	1	B	B	B	B	2012
91E0	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	10,7490			G	B	2	1	1	C	B	B	C	2012
91E0	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	6,1530			G	B	2	1	1	B	B	B	C	2012

Artenlisten nach Anh. II FFH-RL und Anh. I VSch-RL sowie die wichtigsten Zugvogelarten

Taxon	Name	S	NP	Status	Dat.-Qual.	Pop.-Größe	rel.-Grö. N	rel.-Grö. L	rel.-Grö. D	Biog.-Bed.	Erh.-Zust.	Ges.-W. N	Ges.-W. L	Ges.-W. D	Anh.	Jahr
AMP	Triturus cristatus [Kammmolch]			r	kD	r	2	1	1	h	B	B	B	C	II	2011
AVE	Accipiter gentilis [Habicht]			n	G	1 - 5			1	h	B			C	VR-Zug	2011
AVE	Anthus pratensis [Wiesenpieper]			n	G	6 - 10			1	h	B			C	VR-Zug	2011
AVE	Asio otus [Waldohreule]			n	G	1 - 5			1	h	B			C	VR-Zug	2011
AVE	Buteo buteo [Mäusebussard]				G	6 - 10			1	h	B			C	VR-Zug	2011
AVE	Ciconia nigra [Schwarzstorch]			n	G	1 - 5			1	h	B			C	VR	2011
AVE	Columba oenas [Hohltaube]			n	G	1 - 5			1	h	B			C	VR-Zug	2011
AVE	Coturnix coturnix [Wachtel]			n	G	1 - 5			1	h	B			C	VR-Zug	2011
AVE	Dendrocopos medius [Mittelspecht]			n	G	6 - 10			1	h	B			C	VR	2011
AVE	Dryocopus martius [Schwarzspecht]			n	G	1 - 5			1	h	B			C	VR	2011
AVE	Emberiza calandra [Grauammer]			n	G	11 - 50			1	h	B			C	VR-Zug	2011
AVE	Emberiza hortulana [Ortolan]		X	n	G	1 - 5			1	h	B			C	VR	2011
AVE	Falco tinnunculus [Turmfalke]			n	G	1 - 5			1	h	B			C	VR-Zug	2011
AVE	Glaucidium passerinum [Sperlingskauz]		X	n	G	1 - 5			1	h	B			C	VR	2011
AVE	Jynx torquilla [Wendehals]			n	G	1 - 5			1	h	B			C	VR-Zug	2011
AVE	Lanius collurio [Neuntöter]			n	G	11 - 50			1	h	B			C	VR	2011
AVE	Lanius excubitor [Raubwürger]			n	G	1 - 5			1	h	B			C	VR-Zug	2011
AVE	Locustella fluviatilis [Schlagschwirl]			n	G	1 - 5			1	h	B			C	VR-Zug	2011
AVE	Lullula arborea [Heidelerche]			n	G	1 - 5			1	h	B			C	VR	2011
AVE	Milvus migrans [Schwarzmilan]		X	n	G	1 - 5			1	h	B			C	VR	2011
AVE	Milvus milvus [Rotmilan]		X	n	G	1 - 5			1	h	B			C	VR	2011
AVE	Motacilla cinerea [Gebirgsstelze]			n	G	1 - 5			1	h	B			C	VR-Zug	2011

AVE	Pernis apivorus [Wespenbussard]			n	G	1 - 5			1	h	B			C	VR	2011
AVE	Phoenicurus phoenicurus [Gartenrotschwanz]			n	G	1 - 5			1	h	B			C	VR-Zug	2011
AVE	Picus canus [Grauspecht]			n	G	1 - 5			1	n	B			C	VR	2011
AVE	Saxicola rubetra [Braunkehlchen]			n	G	6 - 10			1	h	B			C	VR-Zug	2011
AVE	Saxicola rubicola [Schwarzkehlchen]			n	G	1 - 5			1	h	B			C	VR-Zug	2011
AVE	Streptopelia turtur [Turteltaube]			n	G	1 - 5			1	h	B			C	VR-Zug	2011
AVE	Sylvia nisoria [Sperbergrasmücke]			n	G	6 - 10			1	w	B			C	VR	2010
AVE	Tringa ochropus [Waldwasserläufer]			n	G	1 - 5			1	w	B			C	VR-Zug	2011
COL	Lucanus cervus [Hirschkäfer]			r	kD	r	1	1	1	h	B	B	B	C	II	2006
COL	Osmoderma eremita [Eremit]			r	kD	r	3	2	1	h	B	A	A	C	II	1999
FISH	Cottus gobio [Groppe]			r	kD	r			1	o	C			C	II	2004
MAM	Barbastella barbastellus [Mopsfledermaus]			r	kD	v	1	3	1	h	B	B	B	C	II	1999
MAM	Lutra lutra [Fischotter]			r	kD	p			1	h	B			C	II	2014
MAM	Myotis bechsteinii [Bechsteinfledermaus]			r	kD	v	1	1	1	h	B	B	B	C	II	1999
MAM	Myotis myotis [Großes Mausohr]			r	kD	p	1	1	1	h	B	B	B	C	II	1999
ODON	Leucorrhinia pectoralis [Große Moosjungfer]			r	kD	r	2	2	1	h	B	B	B	C	II	2003

weitere Arten

Taxon	Code	Name	S	NP	Anh. IV	Anh. V	Status	Pop.-Größe	Grund	Jahr
AMP	BUFOCALA	Bufo calamita [Kreuzkröte]			X		r	p	g	2011
AMP	HYLAARBO	Hyla arborea [Laubfrosch]			X		r	p	g	2011
AMP	PELOFUSC	Pelobates fuscus [Knoblauchkröte]			X		r	p	g	2011
AMP	RANAARVA	Rana arvalis [Moorfrosch]			X		r	p	g	2009
AMP	RANAESCU	Rana kl. esculenta [Teichfrosch]				X	r	p	k	2011
AMP	RANATEMP	Rana temporaria [Grasfrosch, Taufrosch]				X	r	p	k	2011
AMP	TRITALPE	Triturus alpestris [Bergmolch]					r	p	t	1999
AVE	PICUVIRI	Picus viridis [Grünspecht]					n	1 - 5	t	2011
AVE	STRIALUC	Strix aluco [Waldkauz]					n	1 - 5	t	2011
FISH	BARBBARB	Barbus barbus [Barbe]				X	r	p	k	2007
FISH	CARACARA	Carassius carassius [Karausche]					r	p	g	1999
FISH	NOEMBARB	Noemacheilus barbatulus (= Barbatula barbatula [Bachschmerle,Schmerle])					r	p	g	1999
FISH	SALMTR_F	Salmo trutta fario (= Salmo trutta [Forelle, Bachforelle])					r	p	g	1999
LEP	APATIRIS	Apatura iris [Großer Schillerfalter]					r	p	t	1999
LEP	PROSPROS	Proserpinus proserpina [Nachtkerzenschwärmer]			X		r	p	k	2005
MAM	FELISILV	Felis silvestris [Wildkatze]			X		r	p	k	2015
MAM	MUSCAVEL	Muscardinus avellanarius [Haselmaus]			X		r	p	k	2014
MOL	HELIPOMA	Helix pomatia [Weinbergschnecke]				X	r	p	k	2004

ODON	AESHJUNC	Aeshna juncea [Torf-Mosaikjungfer]					r	p	t	1999
ODON	ISCHPUMI	Ischnura pumilio [Kleine Pechlibelle]					r	p	t	1999
PFLA	CAREPEND	Carex pendula [Hänge-Segge]					r	p	t	1999
PFLA	CIRSHELE	Cirsium helenioides (= Cirsium heterophyllum [Verschiedenblättrige Kratzdistel])					r	p	t	1999
REP	COROAUST	Coronella austriaca [Schlingnatter]			X		r	p	g	2012
REP	LACEAGIL	Lacerta agilis [Zauneidechse]			X		r	p	k	2011
REP	LACEVIVI	Lacerta vivipara (= Zootoca vivipara [Waldeidechse])					r	p	t	1999
REP	NATRNATR	Natrix natrix [Ringelnatter]					r	p	g	1999
REP	VIPEBERU	Vipera berus [Kreuzotter]					r	p	g	1999
SONS	ASTAASTA	Astacus astacus [Edelkrebs]				X	r	p	g	2004

Legende

Grund	Status
e: Endemiten	a: nur adulte Stadien
g: gefährdet (nach Nationalen Roten Listen)	b: Wochenstuben / Übersommerung (Fledermäuse)
i: Indikatorarten für besondere Standortsverhältnisse (z.B. Totholzreichtum u.a.)	e: gelegentlich einwandernd, unbeständig
k: Internationale Konventionen (z.B. Berner & Bonner Konvention ...)	g: Nahrungsgast
l: lebensraumtypische Arten	j: nur juvenile Stadien (z.B. Larven, Puppen, Eier)
n: aggressive Neophyten (nicht für FFH-Meldung)	m: Zahl der wandernden/rastenden Tiere (Zugvögel...) staging
o: sonstige Gründe	n: Brutnachweis (Anzahl der Brutpaare)
s: selten (ohne Gefährdung)	r: resident
t: gebiets- oder naturraumtypische Arten von besonderer Bedeutung	s: Spuren-, Fährten- u. sonst. indirekte Nachweise
z: Zielarten für das Management und die Unterschutzstellung	t: Totfunde, (z.B. Gehäuse von Schnecken, Jagdl. Angaben, Herbarbelege...)
Populationsgröße	u: unbekannt
c: häufig, große Population (common)	w: Überwinterungsgast
p: vorhanden (ohne Einschätzung, present)	
r: selten, mittlere bis kleine Population (rare)	
v: sehr selten, sehr kleine Population, Einzelindividuen (very rare)	

Literatur:

Nr.	Autor	Jahr	Titel	Zeitschrift	Nr.	Seiten	Verlag
st0178	Böhnert, W.	1995	Eine Naturschutzkonzeption für den Zeitzer Forst	Tagungsband zum Symposium anläßl. 90. Geburtst. E. Künstler		122-124	Landratsamt Burgenlandkreis
st0190	Fischer, K., Kunze, P., Unruh, M.	1997	Naturschutzgebiet 'Zeitzer Forst': Pflege- und Entwicklungsplan	Erläuterungsbericht		91	Planungsbüro Zimmermann Anh
st0245	Reuter, B.	1986	Landschaftsschutzgebiete des Bezirkes Halle			96	Stadtfachausschuss Halle

Dokumentation/Biotopkartierung:

selektive Biotopkartierung, 1. Durchgang und flächendeckende Luftbildauswertung.
Terrestrische Erhebungen (FFH-Kartierung) Wald- und Offenland-LRT 2012

Dokumentationslink:

Eigentumsverhältnisse:

Bund	0 %

Land	0 %
Kommunen	0 %
Sonstige	0 %
gemeinsames Eigentum/Miteigentum	0 %
Privat	0 %
Unbekannt	0 %